Молодые звездообразующие комплексы в галактиках раннего типа

Прошина И.С.¹, Моисеев А.В.^{1,2}, Сильченко О.К.¹

1- ГАИШ МГУ, 2- CAO РАН

Линзовидная галактика NGC 4324

Изображение в эмиссионной линии $H\alpha$

Изображение в эмиссионной линии $[NII]\lambda 6583$

УФ-изображение в полосе FUV (AIS)

УФ-изображение в полосе NUV (AIS)

Основные параметры галактики

Тип (NED)	SA(r)0+
Расстояние, Мпк (NED)	26.2
V_p , км/с (NED)	1667 ± 3
Наклон i (NED)	63°
$PA_{\text{фот}}$ (NED)	52°
R_{25} (NED, RC3)	82.65 "
M_H (NED), mag	-23.43
M_B (LEDA), mag	-19.12

SDSS-изображение в u -полосе с выделенными на нём синим цветом клампами и наложением $H\alpha$ -клампов (красные апертуры)

SDSS-изображение в g -полосе с наложением u -клампов (синие апертуры) и $H\alpha$ -клампов (красные апертуры)

SDSS-изображение в r -полосе с наложением u -клампов (синие апертуры) и $H\alpha$ -клампов (красные апертуры)

SDSS-изображение в z -полосе с наложением u -клампов (синие апертуры) и $H\alpha$ -клампов (красные апертуры)

Депроцированное изображение в эмиссионной линии $H\alpha$ с выделением взаимно противоположных клампов

Номер $H\alpha$ -клампа	$SFR_{H\alpha}$ ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)	SFR_{FUV} ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)	SFR_{NUV}^{mean} ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)
1	0.009	0.004	0.0093 ± 0.0015
2	0.007	0.007	0.0090 ± 0.0010
3	0.006	0.007	0.0077 ± 0.0006
4	0.006	0.007	0.0077 ± 0.0006
5	0.006	0.008	0.0070 ± 0.0010
6	0.007	0.007	0.0070 ± 0.0010
7	0.013	0.003	0.0057 ± 0.0006
8	0.005	0.006	0.0053 ± 0.0006
9	0.006	0	0.0043 ± 0.0006
10	0.005	0.004	0.0037 ± 0.0006
11	0.006	0.005	0.0050 ± 0.0000
12	0.008	0.007	0.0067 ± 0.0006
13	0.032	0.004	0.0083 ± 0.0006
14	0.010	0.007	0.0093 ± 0.0012
15	0.010	0.008	0.0093 ± 0.0006
16	0.011	0.004	0.0090 ± 0.0010
17	0.006	0.004	0.0073 ± 0.0006
18	0.007	0.004	0.0070 ± 0.0000

Выводы

- С помощью фотометра с перестраиваемым фильтром MaNGaL, разработанного в CAO РАН, на 2.5-метровом телескопе КГО ГАИШ МГУ нами получены изображения в узких эмиссионных линиях $H\alpha$ и $[NII]\lambda 6583$ линзовидной галактики NGC4324, имеющей молекулярный газ массой $\sim 10^8 M_{\text{sun}}$, сосредоточенный в кольце (Alatalo et al. 2013, MNRAS, 432, 1796), совпадающем по морфологии и кинематике с кольцом, видимым в оптическом диапазоне. Нами установлено, что ионизованный газ в этом кольце (на расстоянии ~ 2.9 кпк от центра галактики) возбуждён в основном излучением молодых звёзд. Причём звездообразование протекает не равномерно вдоль кольца, а в отдельных конденсациях – клампах – с характерным размером ~ 0.5 кпк и характерным расстоянием между $H\alpha$ -клампами ~ 0.7 кпк, тогда как характерные расстояния между выделенными по SDSS-изображению в u -полосе конденсациями – молодыми звёздными скоплениями – 1.05 кпк и 1.4 кпк. (Характерные расстояния были определены по депроцированным изображениям с $PA=53^\circ$ и $i=63^\circ$.)
- Нами произведена оценка темпов звездообразования по трём индикаторам: по потокам в линии $H\alpha$, а также по потокам в FUV и NUV, характеризующим звездообразование на разных временных шкалах (до 10 млн. лет — по потоку в $H\alpha$, до 100 млн. лет — по потоку в FUV, до 200 млн. лет — по потоку в NUV (Kennicutt & Evans, 2012, ARAA, 50, 531)). Для этой цели были использованы УФ-изображения исследуемой галактики, полученные космическим телескопом GALEX. Металличность газа (по Pettini & Pagel, 2004, MNRAS, 348, L59) от клампа к клампу меняется в зависимости от темпов звездообразования: эта зависимость носит обратный характер. Предположительно, звездообразование в клампах происходит в виде коротких вспышек, повторяющихся в течение нескольких сотен млн. лет.
- Наиболее вероятный источник газа – аккреция гигантских газовых облаков или богатых газом спутников галактики.

Эллиптическая (?) галактика NGC 5173

Основные параметры галактики

Тип (Buta, 2019)	SA(rs)0/a
Расстояние, Мпк (NED)	38.0
V_p , км/с (NED)	2420 ± 2
Наклон i (NED)	21.8°
$PA_{\text{фот}}$ (NED)	130°
R_{25} (NED, RC3)	53.35 "
M_H (NED), mag	-22.64
M_B (LEDA), mag	-19.71

Изображение в эмиссионной линии $H\alpha$

Изображение в эмиссионной линии $[NII]\lambda 6583$

Изображение в эмиссионной линии $[OIII]\lambda 5007$

Положение $H\alpha$ -клампов на BPT-диаграмме

УФ-изображение в полосе FUV (GI)

УФ-изображение в полосе NUV (GI)

Номер клампа	$SFR_{H\alpha}$ ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)	SFR_{FUV} ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)	SFR_{NUV} ($M_{\text{sun}}/\text{год} \cdot \text{кпк}^2$)
1	0.0042	0.0043 ± 0.0005	0.0044 ± 0.0001
2	0.0031	0.0029 ± 0.0001	0.0032 ± 0.0001
3	0.0030	0.0027 ± 0.0001	0.0026 ± 0.0002
4	0.0064	0.0058 ± 0.0000	0.0068 ± 0.0005
5	0.0080	0.0057 ± 0.0000	0.0074 ± 0.0005
6	0.0011	0.0008 ± 0.0000	0.0008 ± 0.0001
7	0.0016	0.0012 ± 0.0000	0.0012 ± 0.0001
8	0.0015	0.0014 ± 0.0001	0.0013 ± 0.0001
9	0.0026	0.0011 ± 0.0001	0.0010 ± 0.0001

Выводы

- С помощью картировщика MaNGaL (Moiseev et al., 2020, Experimental Astronomy, 50, 199) на 2.5-метровом телескопе КГО ГАИШ МГУ получены изображения в узких эмиссионных линиях $H\alpha$, $[NII]\lambda 6583$ и $[OIII]\lambda 5007$ богатой газом галактики раннего типа NGC 5173 ($M_H \sim 10^9 M_{\text{sun}}$ (Knapp & Raimond, 1984, A&A, 138, 77)). На этих изображениях нами обнаружены компактные конденсации, особенно выделяющиеся на $H\alpha$ -картах и являющиеся областями звездообразования. Диагностируемое звездообразование привело за прошедшие несколько сотен млн. лет к формированию компактных массивных звёздных скоплений с ударным возбуждением газа вокруг них.
- Газ, вероятно, был недавно аккрецирован галактикой с наклонного направления в результате поглощения богатого газом спутника.